Velociraptorius

Velociraptorius (lot. *Velociraptor mongoliensis*, „greitas vagis“) – mažas, judrus, laibas plėšriųjų dinozaurų (*Theropoda*) dinozauras. Kaukolė viršuje lenkta, 249 mm ilgio. Turi pjautuvo formos nagus ir po didelį antrą kojos pirštą.

Paplitimo arealas – centrinė Azija. Gyveno prieš 80-70 mln. metų kreidos periode. Bendras svoris 15-20 kg. Ilgis 1,8 m., ūgis 0,5 m.

Pirmasis atrado ir aprašė šią rūšį paleontologas Henris F. Osbornas. Rūšis surasta Mongolijoje 1924 metais.



Palyginimui velociraptorius ir žmogus

Filogenetinis medis

Velociraptor mongoliensis

Velociraptorius
(*Velociraptor mongoliensis*)

Mokslinė klasifikacija

Karalystė:	Gyvūnai (*Animalia*)
Tipas:	Chordiniai (*Chordata*)
Klasė:	Ropliai (*Sauropsida*)
Antbūris:	Dinozaurai (*Dinosauria*)
Būrys:	Driežadubeniai dinozaurai (*Saurischia*)
Pobūris:	Plėšrieji dinozaurai (*Theropoda*)
Antšeimis:	*Coelurosauria* (*Coelurosauria*)
Šeima:	*Dromaeosauridae* (*Dromaeosauridae*)
Gentis:	*Velociraptor* (*Velociraptor*)
Rūšis:	Velociraptorius (*Velociraptor mongoliensis*)

Binomas

Velociraptor mongoliensis

Osborn, 1924





Vikiteka

Rodomas puslapis "https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Velociraptorius&oldid=5099504"

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 12 lapkričio 2016 18:56.

Tekstas pateikiamas pagal Creative Commons Attribution/Share-Alike Licenciją; gali būti taikomos papildomos sąlygos. Detaliau – Terms of Use .